Gerência de Enfermagem e Núcleo de Gestão Assistencial
Fluxograma de Acesso à Anticoagulação Oral

Médico Cardiologista identifica usuário com potencial necessidade de Anticoagulação Oral

- **Cardiologista** insere usuário na planilha;
- **Médico** do Ligue Web Saúde identifica; e
- Encaminha laudo para médico da UBSF.

Médico Assistente identifica usuário com necessidade de Anticoagulação Oral Contínua

- Acidente Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico Cardioembólico;
- Fibrilação Atrial (FA), CHADS-VASc >1;
- Prótese Valvar Metálica;
- Tromboembolismo Venoso (TEV), espontâneo e/ou recorrente (fora da fase aguda).

Usuário em **USO** de anticoagulação oral e acompanhamento **regular**

Usuário:
- Mantem acompanhamento da anticoagulação no Serviço de Saúde que já o atende

Usuário em **USO** de anticoagulação oral e acompanhamento **irregular**

Médico Assistente:
- Solicita **TAP** em até 05 dias;
- Mantem acompanhamento na UBSF; **ou**
- Agenda paciente para o Serviço do Ligue Web Saúde.

Usuário SEM anticoagulação oral

- Sangramento ativo;
- Hemofilia ou outra coagulopatia;
- Plaquetopenia grave (contagem de plaquetas < 50,000/microL);
- Trauma grave recente;
- Procedimento invasivo ou obstétrico (recente, emergencial ou planejado);
- Hemorragia intracraniana prévia;
- Tumor intracraniano ou espinhal;
- Cirrose hepática grave;
- Hipertensão grave e não controlada.

Usuário possui **alguma contraindicação absoluta** à anticoagulação oral no momento?

Sim

Médico Assistente:
- Solicita teleconsultoria para hematologia ou cardiologia.

Não

Médico Assistente:
- Inicia varfarina 2,5 mg/dia;
- Agendar consulta em 48 horas com o Serviço do Ligue Web Saúde.

Serviço do Ligue Web Saúde:
- Agenda TAP após 5º dia do início da medicação;
- Avalia RNI até 2dias após exame; e
- Mantem seguimento no Serviço.